

BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİNİN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- TRAKYEM buzağı başlangıç yemi buzağının doğumu takiben 2. haftadan itibaren 12. hafta sonuna kadar beslenmesinde kullanılır.
- TRAKYEM buzağı başlangıç yemi buzağının yaşam gücünü artırır ve buzağı ishallerini önler.
- İşkembe gelişimini hızlandırarak yemden yararlanmayı artırır.
- Yüksek besin maddesi içeriği ile buzağının canlı ağırlıklarını artırır, vücut kondisyonunu iyileştirir.
- Süt ve kaliteli kuru ot ile birlikte kullanılarak, buzağının iskelet gelişiminin en iyi şekilde oluşmasını sağlayarak, buzağının damızlık değerini artırır.
- TRAKYEM buzağı başlangıç yemi sağlıklı bir şekilde ve erken süttten kesilme sağlar.

BUZAĞI BÜYÜTME YEMİNİN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- TRAKYEM buzağı büyüme yemi buzağının 3. aydan itibaren 6. ayın sonuna kadar beslenmesinde kullanılır.
- Enerji ve protein bakımından zengin, sindirilebilirliği yüksektir.
- Döve dönemi öncesi dişi buzağının iyi bir vücut kondisyonuna ulaşmalarını sağlar.
- TRAKYEM buzağı büyüme yemi dişi buzağının ilerleyen dönemde döl tutma oranını artırır.
- Besi dönemi öncesinde erkek buzağının iyi bir iskelet yapısına sahip olmalarını sağlar.
- İlk kızgınlık ve tohumlama yaşlarına uygun ağırlıklara gelinmesini sağlar.
- TRAKYEM buzağı büyüme yemi buzağının vücut direncini ve dayanıklılığını artırır.

Analitik Değerler	Buzağı Başlangıç Yemi	Buzağı Büyütme Yemi
Ham Protein (%)	18	17
Ham Selüloz (%)	10 - 12	10 - 12
Ham Kül (%)	10	10
Sodyum (%)	0,25	0,25
Ham Yağ (%)	3 - 4,5	2 - 3,5
Vitamin A IU/Kg	15.000	15.000
Vitamin D3 IU/Kg	3.000	3.000
Vitamin E Mg/Kg	25	25

BUZAĞI YEMLERİ KULLANILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- TRAKYEM buzağı yemlerini kullanırken buzağının önünde sürekli taze ve temiz su bulundurulmalıdır.
- Buzağılara iç ve dış parazit mücadelesi mutlaka yapılmalıdır.
- Buzağının koruyucu aşıları ve sağlık hizmetleri aksatılmamalıdır.
- Buzağılara 15-20 °C derece olan ortam sağlanmalıdır.
- Buzağınlar hava cereyanına maruz bırakılmamalıdır.
- Buzağınların altları sürekli kuru ve temiz tutulmalıdır.
- Doğan her buzağıya doğumdan hemen sonra buzağı sepsisemi serumu yapılması yararlı olur.
- Göbek kordonunu 5-6 cm olacak şekilde tutmalıdır.
- Bu kordonu en az 4 gün ve günde 1 kez tentürdiyot ile ilaçlamak gereklidir.

